


Függvények változási sebessége

Legyen x az $f(x)$ folytonos függvény értelmezési tartományának egy rögzített belső pontja. Vegyük tetszőleges (de „közele”) h mellett az $x + h$ pontot, és képezzük az

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

hányadost. Ezt a hányadost az $f(x)$ függvény x pontban vett **meredekségének** (differenciáhányadosának) nevezzük.

Nyilvánvaló, hogy a differenciáhányados h -függvénye. (Itt x -et rögzítettük.) Ahogy az ábrán láthatjuk a differenciáhányados a függvény görbéjének $f(x)$, és $f(x+h)$ ordinátájú pontjait összekötő húr (szelő) iránytangensét jelenti. (A hányados éppen az $f(x+h) - f(x)$ és a h szakaszok hányadosa.)



A differenciáhányados

Példa. Írjuk fel az $f(x) = x^2 - x + 3$ függvény differenciáhányadosát

Megoldás.
$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - (x+h) + 3 - (x^2 - x + 3)}{h} = 2x + h - 1.$$

A differenciálhányados

A

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

határértéket az $f(x)$ függvény x pontban vett **differenciálhányadosának** (**deriváltjának**) nevezzük.

A fenti határértéket $f'(x)$ -szel jelöljük, azaz

$$\frac{df}{dx} = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Szokásos jelölések még az $y = f(x)$ felírásból: $\frac{dy}{dx}$, $y'(x)$, de akár röviden y' . Ez utóbbinál tudni kell, mi az argumentum.

Az f' értelmezési tartománya azokból a pontokból áll, ahol a fenti (véges) határérték létezik.

Azt a műveletet, amellyel a derivált függvényt meghatározzuk, **differenciálásnak** nevezzük.

Példa. Számítsuk ki a korábbi példában szereplő függvény differenciál-hányadosát!

Megoldás. Mivel $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2x + h - 1$, ezért

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h - 1) = 2x - 1.$$


A differenciálhányados geometriai jelentése

Az ábrán láthatjuk, hogy ha a h -val tartunk a zérushoz, akkor $x+h$ tart x -hez, és a szelő ebben a „határhelyzetben” az x -pontbeli érintővé válik. De ha $h \rightarrow 0$, akkor a differenciálhányados a differenciálhányadoshoz, azaz az érintő iránytangenséhez tart.

Ez azt jelenti, hogy valamely konkrét x_0 pontban a differenciálhányados (azaz $f'(x_0)$) az érintő iránytangensét adja. Az érintő egyenlete így

$$y(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

(Ez az x_0 ponton átmenő adott iránytangensű egyenes egyenlete.)



Példa. Adjuk meg a korábbi példában szereplő $f(x) = x^2 - x + 3$ függvény $x=2$ pontban vett érintőjének egyenletét.

Megoldás. Mivel $f'(x) = 2x - 1$, ezért $f'(2) = 3$ és így, mivel $f(2) = 5$, azt kapjuk, hogy az érintő egyenlete:

$$y - 5 = 3(x - 2),$$

vagyis a szokásos alakban:

$$y = 3x - 1.$$

Elemi függvények deriváltfüggvénye

Az

$$f(x) = x^n$$

függvény differenciálható és

$$f'(x) = nx^{n-1},$$

azaz

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

Tehát pozitív egész kitevőjű hatványfüggvényt úgy differenciálhatunk, hogy a kitevőt 1-gyel csökkentjük és az eredeti kitevővel szorzunk.

Bizonyítás. A definíció szerint

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} =$$

a binomális tételt alkalmazva

$$\begin{aligned} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left[x^n + nx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}h^2 + \dots + nxh^{n-1} + h^n \right] - x^n}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}h^2 + \dots + nxh^{n-1} + h^n}{h}. \end{aligned}$$

Egyszerűsítsünk h -val; azt kapjuk, hogy

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}h + \dots + nxh^{n-2} + h^{n-1} \right].$$

Az első kivételével minden tagban szerepel a h tényezőként, így ezek nullához tartanak, ha $h \rightarrow 0$.
Ebből következik, hogy

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$

A szinusz és koszinusz függvények deriváltja:

$$\sin'(x) = \frac{d \sin x}{dx} = \cos x; \quad \cos'(x) = \frac{d \cos x}{dx} = -\sin x.$$

Bizonyítás. A szinusz függvényre:

$$\begin{aligned} \frac{d \sin x}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \frac{\sin h}{h} \right]. \end{aligned}$$

Tudjuk, hogy

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1.$$

Másrészt, használjuk fel az

$$1 - \cos h = 2 \sin^2 \frac{h}{2}$$

azonosságot, végezzük el az alábbi átalakításokat:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{-2 \sin^2 \frac{h}{2}}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\sin \frac{h}{2} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \right).$$

Mivel $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = 1$, és $\lim_{h \rightarrow 0} \sin \frac{h}{2} = 0$, azt kapjuk, hogy

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0.$$

Így azt kapjuk, hogy

$$\frac{d \sin x}{dx} = \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = \cos x.$$

A koszinusz függvény deriváltjának meghatározása:

$$\begin{aligned}\frac{d \cos x}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \frac{\sin h}{h} = \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = -\sin x.\end{aligned}$$

Az $f(x) = c$ konstans függvény deriváltja az azonosan 0 függvény, azaz

$$(c)' = 0.$$

Bizonyítás. $f'(x) = (c)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = 0.$

Differenciálási szabályok – függvények összegének, szorzatának és hányadosának deriváltja

Legyenek f és g differenciálható függvények, akkor $f + g$ is differenciálható itt, és

$$(f + g)' = f' + g'$$

Legyenek f és g differenciálható függvények, akkor fg is differenciálható itt, és

$$(fg)' = f'g + fg'$$

egyenlőség adódik.

Legyenek f és g differenciálható függvények, ahol $g(x) \neq 0$, akkor $\frac{f}{g}$ is differenciálható itt, és

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$